

This document aims to clarify how Equelite will deal with de-escalation. It will be updated as the Government clarifies and/or establishes new measures.

PROTOCOL OF ACTION FOR SHORT-TERM PLAYERS

JC FERRERO-EQUELITE SPORT ACADEMY

1- Every player or relative staying at the academy as well as taking part in any of our programs: Short-term competition, Adult program and Summer Stage.

2- The program must be booked at least 8 days before the starting date. The program will be one-week-long as minimum.

3- It is compulsory to have the test of the COVID-19 done. We ask for any valid test, it can be the most common type of rapid diagnostic test marketed for COVID-19. The test that detects the presence of antibodies in the blood of people believed to have been infected with COVID-19.

4- If the test is done in the place of residence, it must be done a few days before Sunday (the arrival day). The academy will send a reminder and will request for the results and a confirmation form signed, to try to reduce the possible risk of contagion.

5- The test can be done at the academy, once you have booked the program, you should inform us and we will organize an appointment with a clinic to do the test at your arrival. In this case, the check in at the academy will be on Sunday from 16h, and the test will be done on Monday before 13h. It is a rapid test with a sensitivity of 97/98%, and the results will be available the same morning. It has a cost of 50€

6- We highly recommend the use of the mask, as well as keep social distancing and follow the staff indications

7- It is strictly forbidden to share personal items as towels, bottles, racquets, etc.

8- You must inform our staff if you have symptoms.

Limitación del procedimiento

- Los resultados de las pruebas de este producto deben ser valorados exhaustivamente por el médico junto con otra información clínica (no deben usarse como criterio único).
- El producto sirve para detectar la presencia del anticuerpo contra el SARS-CoV-2 en la muestra analizada.

Índice de rendimiento del producto

1. Propiedades físicas

- Aspecto
La tarjeta de prueba debe estar limpia y completa, sin rebabas, daños ni contaminación. El material debe fijarse firmemente. La etiqueta debe ser claramente legible y no debe estar dañada. La dilución de muestra debe ser transparente, sin impurezas ni floculos.
- Velocidad de migración del líquido
- Anecho de la tira de membrana
- Volumen de dilución de muestra
El ancho de la tira de membrana (tira de prueba) debe ser $\geq 2,5$ mm.

2. Límite de detección

Para la detección de material de referencia de sensibilidad, la tasa de detección positiva no debe ser inferior al 90 %.

3. Tasa de cumplimiento de material de referencia negativo

Para la detección de material de referencia negativo, la tasa de detección negativa debe ser del 100 %.

4. Tasa de cumplimiento de material de referencia, positivo

Para la detección de material de referencia positivo, la tasa de detección positiva debe ser del 100 %.

5. Repetibilidad

Para la detección del material de referencia de la empresa P2 y P4, los resultados deben ser positivos y el color debe ser uniforme.

6. Reproducibilidad

En diferentes sitios de detección, los resultados de detección del material de referencia de la empresa P2 y P4 utilizado por diferentes operadores deben ser positivos y el color debe ser uniforme.

7. Especificidad analítica

7.1 Reactividad cruzada: Este dispositivo de prueba no presenta reactividad cruzada con los anticuerpos contra los siguientes virus: el coronavirus humano endémico OC43, el virus de la gripe A, el virus de la gripe B, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, el virus de Epstein-Barr, el virus del sarampión, el citomegalovirus, el rotavirus, el norovirus, el virus de las paperas y el virus de la varicela-zóster, ni tampoco con el anticuerpo contra la bacteria Mycoplasma pneumoniae.

7.2 Sustancias interferentes:

Los resultados de la prueba no deben interferir con las siguientes sustancias en las concentraciones indicadas:
 bilirrubina en concentraciones ≤ 250 $\mu\text{mol/l}$; triglicéridos en concentraciones ≤ 15 mmol/l ; hemoglobina en concentraciones ≤ 10 g/dl ;
 factor reumatoide en concentraciones ≤ 80 RU/ml ; anticuerpo antiinmunitario en concentraciones ≤ 80 U/ml ; anticuerpo antinuclear en concen-

Explicación de los símbolos utilizados

	NO USAR SI EL PAQUETE ESTÁ DAÑADO
	CONSULTAR LAS INSTRUCCIONES DE USO
	NO REUTILIZAR
	FECHA DE CADUCIDAD
	LÍMITE DE TEMPERATURA
	FECHA DE FABRICACIÓN
	FABRICANTE
	CODIGO DE LOTE
	MANTENER LEJOS DE LA LUZ SOLAR
	MANTENER SECO
	DISPOSITIVO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO IN VITRO
	MARCA CE
	REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA UNIÓN EUROPEA



Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.
 Dirección: 3th Floor and 5th Floor Building 7-1 No.37
 Chaoyuan Road, Changping District, Beijing, 102200, China
 Tel.: +86-10-80 23100
 E-mail: internatinal@lepuomedical.com www.lepuomedical.com



Lepu Medical (Europe) Cooperative U.A
 Ate Lenstra Boulevard 36, 8448 JB,
 Heerenveen, Países Bajos
 Tel.: +31-515-573399 Fax: +31-515-760020

Fecha de aprobación y fecha de revisión de las instrucciones de uso:
 aprobadas el 7 de febrero de 2020, revisadas el 3 abril de 2020
 Número de versión: IN-ES-CG25 Rev.02

traciones ≤ 80 U/ml ; IgG total en concentraciones ≤ 14 g/l .

Los resultados de la prueba no deben verse influidos por las siguientes sustancias: interferón alfa, zanamivir, oseltamivir, paramivir, lopinavir, ritonavir, abidol, levofloxacina, azitromicina, ceftriaxona, meropenem, tobramicina, clonhidrato de histamina, fenilefrina, oximetazolina, cloruro de sodio (que contiene conservantes), beclometasona, dexametasona, flunisolida, triamcinolona, budesonida, mometasona y fluticasona.

8. Rendimiento clínico

Se recogieron 220 muestras clínicas basadas en el método de detección de ácido nucleico (PCR), que inclúan 93 muestras positivas y 127 negativas. La prueba de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 se comparó con el método de ácido nucleico (PCR) utilizando las muestras clínicas recogidas. Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Prueba de detección de anticuerpos contra el SARS-CoV-2	Método de detección de ácido nucleico (PCR)	
	Positivo	Negativo
Cantidad de muestras	93	127
IgM positivo	2	0
IgG positivo	20	3
IgM e IgG positivo	70	0
IgM e IgG negativo	1	124
Sensibilidad diagnóstica	98,9 %	
Especificidad diagnóstica		97,6 %

Medidas de precaución


- La prueba solo debe ser realizada por profesionales con fines de diagnóstico auxiliar in vitro. No utilice productos que hayan caducado.
- No congele ni use el producto después de la fecha de caducidad (indicada en el embalaje).
- Evite la temperatura y la humedad excesivas en el entorno de prueba. La temperatura de recepción debe ser de 15-30 °C y la humedad debe ser inferior al 70 %.
- La bolsa de embalaje contiene desecante, que no debe ingerirse.
- Se recomienda usar sangre fresca para la recolección de muestras. No se recomienda usar muestras de quilo con alto contenido en grasa, muestra con tetericia ni muestras con altas concentraciones de factor reumatoide.
- Cuando realice las pruebas, use ropa protectora, guantes y gafas de protección.
- No use la tarjeta de prueba si tiene el embalaje individual roto, marcas poco claras o fecha de caducidad vencida.
- Desesche las muestras usadas, las tarjetas de prueba y otros residuos de acuerdo con las leyes y las normas locales aplicables.

FASE 1

– A partir del 11 de mayo –

**Recomendaciones
 para la práctica del Tenis**

FASES de la desescalada tras el COVID19



- Respetar las normas de las autoridades y los protocolos del Club en todo momento.
- Llegar vestido de juego con el tiempo justo para salir a jugar.
- Mantén la distancia de 2 m. con las personas.
- Usa mascarilla y guantes hasta entrar a la pista.
- Lava y desinfecta tus manos antes y después de jugar.
- No toques las vallas o la puerta de acceso a la pista.
- Lleva tu bebida y toalla, no compartas.
- Limpia el equipo de juego antes y después de jugar.
- No te toques la cara con las manos.
- Usa pañuelos desechables al estornudar o limpiarte.
- Cubre tus toses y estornudos.
- Juega con pelotas nuevas a ser posible.
- Usa raqueta y pie para recoger la pelota y mandársela al adversario.
- Cruza la pista por el lado opuesto de tu compañero.
- Evita el saludo al final del encuentro.
- No utilices las duchas ni vestuarios del Club.
- No permanezcas en el Club después de jugar.

Freepik® - Recursos Gráficos

